



مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب(س)  
آموزش به بیمار

نام پمفلت:	لاپارسکوپی
تهیه کننده:	فاطمه قاسمی - خدیجه گورکانی
منبع:	زنان و زایمان - ویلیامز
پزشک نایید کننده:	دکتر عقدکی - متخصص زنان و زایمان
تاریخ تهیه:	اردیبهشت 1403

۵

### عوارض بعد از عمل جراحی

تب و لرز

خونریزی

عفونت ناحیه عمل (قرمزی و داشتن ترشحات چرکی)

باز شدن ناحیه عمل

درد ناحیه شانه که اگر شدید شد مراجعه به پزشک

-لخته شدن خون در بدن

-بی اختیاری ادرار

-تنگی نفس

4

### مراقبت های بعد از عمل جراحی

-بیمار تا حداقل 8 ساعت چیزی نخورد و بعد از خوردن از مایعات شروع کند و بعد از خروج گاز شکم غذای جامد مصرف کند.

-پیاده روی روزی 20-30 دقیقه

-مصرف مایعات/عدم مصرف غذای نفاخ

-مصرف آنتی بیوتیک تا یک هفته

-کشیدن بخیه 8 تا 10 روز بعد از عمل با صلاحدید پزشک

-شستشوی ناحیه عمل با شامپو بچه و خشک کردن با سشوار باد سرد با فاصله 20 سانتی متری

-نداشتن نزدیک تا سه هفته بعد از عمل با صلاحدید پزشک

## لاپاراسکوپي

از عمل لاپاراسکوپي برای اعمال تشخیص و جراحی انجام می شود، که به جای یک برش بزرگ از چند برش بسیار کوچک ایجاد می شود که از وسیله ای به نام لاپاراسکوپ که یک لوله کوچک و انعطاف پذیر که یک نور و یک دوربین کوچک در انتهای آن می باشد، استفاده می شود. لوله در یک برش بسیار کوچک از دیواره شکم در نزدیک ناف قرار داده می شود.

در حاملگی خارج رحمی، تورشن تخمدان ها، آپاندیسیت، بیماری التهابی لگن، بستن لوله ها، کیست تخمدان ها، برداشتن لوله ها، برداشتن رحم و برداشتن میوم ها و غیره از عمل جراحی لاپاراسکوپي استفاده می شود.

## عوارض

آسیب به عروق، آسیب به دستگاه ادراری، آسیب به دستگاه گوارش، آسیب به عصب، فتق محل جراحی، خونریزی، عفونت و همچنین عوارض ناشی از استفاده از دی اکسید کربن در طول عمل مثل ورود حباب گاز در ورید و عروق و...

## مزیت عمل جراحی لاپاراسکوپي

-کوچک تر بودن جای زخم عمل  
-نیاز به بخیه کمتر  
-زودتر مرخص شدن بیمار از بیمارستان و بهبودی سریعتر  
-درد و خونریزی کمتر  
-مهم: احساس درد شانه متداول است که حاصل از گاز دی اکسید کربن که در عمل جراحی استفاده می شود.